



**Poder Judiciário**  
Estado do Espírito Santo  
Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes - NAT

---

**PARECER TÉCNICO NAT/TJES Nº 132/2022**

Vitória, 02 de fevereiro de 2022

Processo nº [REDACTED]  
impetrado por [REDACTED] em face de  
[REDACTED]  
[REDACTED]

O presente Parecer Técnico visa atender a solicitação de informações técnicas do 1º Juizado Especial Cível de Itapemirim, requeridas pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Romilton Alves Vieira Júnior, sobre o procedimento: **transferência hospitalar para leito de cirurgia oncológica**

**I - RELATÓRIO**

1. De acordo com os fatos relatados na Inicial, o Requerido, de 78 anos, encontra-se internado no Hospital Menino Jesus desde o dia 25 de janeiro de 2022, com diagnóstico de câncer renal, necessitando com urgência de vaga em cirurgia oncológica. Como até a presente data a transferência não foi efetivada, recorre à via judicial para obter o procedimento.
2. Às fls. 11732788 (Pág. 01), se encontra Evolução Médica, datada de 01/02/2022, emitida pela Dra. Franciele Sesa, informando que o Requerido apresenta queixa de dor abdominal em flanco esquerdo, estando há 15 dias sem evacuar, com inapetência e adinamia e que parou de andar há 15 dias. Informa que teve consulta com oncologista que solicitou exames pré operatórios a fim de realizar cirurgia de nefrectomia radial. No exame físico foi identificado à palpação massa em flanco esquerdo, edema +/4, em uso de cateter nasal a 3L/min (saturação 98%). Consta



**Poder Judiciário**  
Estado do Espírito Santo  
Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes - NAT

---

transcrição de exames laboratoriais que demonstram alteração da função renal e presença de anemia e também de laudo de exame de imagem (TC de abdome e pelve) de 03/11/2021 com descrição de rim esquerdo tópico de dimensões aumentadas devido à presença de volumosa lesão expansiva sólida no terço médio /inferior medindo cerca de 16.3x14.3x12.9 cm e que a lesão envolve a artéria renal esquerda e infiltra o cálice renal e a veia renal esquerda. Identificados linfonodos para aórticos a esquerda medindo 1 cm no menor eixo axial. Placas ateromatosas na aorta e artéria ilíaca. Nódulos não calcificados nos lobos pulmonares inferiores de provável natureza secundária.

3. Às fls. 11732872 (pág. 1 a 8) consta Espelho de Solicitação requerendo a transferência do paciente para leito de cirurgia de oncológica. Na evolução consta que o Requerido está em seguimento no Hospital Evangélico de Cachoeiro aguardando data para biópsia, já tendo sido indicado a realização de exames pré-operatórios para proceder nefrectomia radical.
4. Às fls. 11734952 (pág. 4) se encontra Decisão Judicial determinando que o Estado do ES e o Município de Itapemirim transfira o Requerido no prazo de 24 horas para leito de cirurgia oncológica.

## II - ANÁLISE

### DA LEGISLAÇÃO

1. **A Portaria Nº 399 de 22 de fevereiro de 2006** divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do referido pacto. Em seu Anexo II, item III – Pacto pela Gestão, item 2 – Regionalização, define que um dos Objetivos da Regionalização é garantir a integralidade na atenção à saúde, ampliando o conceito de cuidado à saúde no processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema.



**Poder Judiciário**  
Estado do Espírito Santo  
Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes - NAT

---

2. A **Resolução nº 1451/95** do **Conselho Federal de Medicina** define urgência e emergência:

Artigo 1º - Os estabelecimentos de Prontos Socorros Públicos e Privados deverão ser estruturados para prestar atendimento a situações de urgência-emergência, devendo garantir todas as manobras de sustentação da vida e com condições de dar continuidade à assistência no local ou em outro nível de atendimento referenciado.

Parágrafo Primeiro - Define-se por **URGÊNCIA** a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata.

Parágrafo Segundo - Define-se por **EMERGÊNCIA** a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato.

## **DA PATOLOGIA**

1. O câncer renal perfaz 2% a 3% das neoplasias malignas do adulto, com incidência de 7 a 10 casos por 100.000 habitantes nas regiões mais desenvolvidas do Brasil, mas é o mais letal dos cânceres urológicos.
2. As massas renais são classificadas como sólidas ou císticas.
3. A detecção e caracterização das massas renais são feitas por ultrassonografia (US), tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM). Para a avaliação das massas renais císticas, recomenda-se a classificação de Bosniak, a saber:
  - Classe I: cisto simples. Conteúdo líquido homogêneo, paredes finas, contornos regulares, sem calcificações, septos, espessamento parietal ou realce pós-contraste. Sem necessidade de investigação adicional.
  - Classe II: cisto minimamente complicado. Presença de septos finos (até 2, espessura



## **Poder Judiciário**

Estado do Espírito Santo

Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes - NAT

---

abaixo de 2 mm), mínima calcificação parietal, conteúdo denso, menor que 3 cm, sem realce pós-contraste. Sem necessidade de investigação adicional.

- Classe IIF: cisto minimamente complicado que requer seguimento. Presença maior número de septos finos (3 ou mais) ou espessamento parietal regular, calcificações grosseiras, conteúdo denso, maior que 3 cm, realce presente e não mensurável pós-contraste. Risco de câncer menor que 5%, pelo que há necessidade de reavaliação por TC ou RM em 6 e 12 meses, e depois anualmente durante 5 anos.

- Classe III: cisto moderadamente complicado. Espessamento parietal regular ou irregular, septos espessos (acima de 2 mm) ou irregulares, com realce pós-contraste. Risco de câncer de até 60%, pelo que se indica intervenção cirúrgica.

- Classe IV: neoplasia cística. Espessamento parietal ou septal grosseiro, nodular ou irregular, com componente sólido junto à parede ou septos, com realce pós-contraste. Risco de câncer próximo de 100%, razão por que é indicada intervenção cirúrgica. Inexistem evidências com qualidade suficiente para se recomendar o rastreamento de tumores renais em pacientes assintomáticos.

4. As lesões renais expansivas na sua maioria, sejam sólidas ou císticas, permanecem assintomáticas e impalpáveis até os estágios mais avançados da doença. A maioria dos casos é diagnosticada incidentalmente, pelo uso frequente de exames de imagens indicados para uma variedade de sintomas ou doenças não relacionadas ao câncer. Os tumores renais diagnosticados de forma fortuita perfazem em torno de 75% dos casos e estão associados a melhor prognóstico. Os sintomas incluem dor em flanco, hematúria, massa abdominal palpável, síndromes paraneoplásicas e manifestações de doença metastática, como dor óssea, tosse persistente ou linfadenopatia periférica. O exame físico tem um papel limitado no diagnóstico do câncer de células renais.
5. A TC abdominal e torácica fornece informações sobre a extensão do tumor primário, condição do rim contralateral e presença de metástase(s). Se o resultado da TC for inconclusivo, a RM pode fornecer informações adicionais em relação à massa renal,



**Poder Judiciário**  
Estado do Espírito Santo  
Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes - NAT

---

extensão local e presença de trombo na veia cava.

6. Biópsias usando agulhas finas (calibre 20 ou mais fino) são precisas no diagnóstico de massas renais, permitindo o diagnóstico diferencial entre tumores benignos e malignos e, em alguns casos, a determinação do subtipo de carcinoma de células renais e o grau nuclear de Fuhrman. A punção aspirativa por agulha fina apresenta a vantagem teórica de coletar uma amostra maior de elementos celulares, mas, demonstradamente, possui uma sensibilidade menor (76%). As duas técnicas podem ser usadas de forma complementar, elevando ainda mais a acurácia do procedimento. A biópsia renal percutânea assistida por métodos de imagem deve ser indicada antes de terapias termo-ablativas de massas sólidas, sendo procedimento diagnóstico mandatório para doentes sem diagnóstico histopatológico anterior e para amparar estratégias de conduta expectantes. **Para as grandes massas renais, em que se antecipa indicação de nefrectomia, não se recomenda a realização prévia de biópsias.**
7. O carcinoma renal de células claras (CRCC) é o tipo histopatológico mais comum, sendo responsável por aproximadamente 90% dos tumores renais. Há outros dois tipos histopatológicos de câncer renal: carcinoma papilífero (10%-15%) e carcinoma cromóforo (4%-5%). Estes tipos histológicos apresentam características morfológicas, genéticas e moleculares distintas, resultando em doenças de prognóstico variável. A presença de áreas de diferenciação sarcomatoide confere um pior prognóstico em qualquer dos tipos histopatológicos.

## **DO TRATAMENTO**

1. A nefrectomia radical é o tratamento de escolha para os doentes com câncer renal, desde que clinicamente aptos para esse procedimento cirúrgico. A linfadenectomia hilar é suficiente para fins de estadiamento, podendo ser reservada a linfadenectomia retroperitoneal ampliada para os casos em que há suspeita macroscópica de



**Poder Judiciário**  
Estado do Espírito Santo  
Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes - NAT

---

- acometimento linfonodal, para fins de estadiamento, pois não resulta em ganho de sobrevida. As técnicas e vias de acesso aberta, laparoscópica (transperitoneal ou retroperitoneal) e robótica permitem resultados oncológicos equivalentes.
2. A nefrectomia parcial poupadora de néfrons deve ser indicada nos casos de tumores com menos de 4 cm, tumores bilaterais, cistos complexos (Bosniak III e IV), doentes com insuficiência renal, assim como em pacientes selecionados com tumores entre 4 cm e 7 cm, com localização favorável à ressecção com margem de segurança. Técnica cirúrgica que minimize o tempo de isquemia do órgão produz resultados oncológicos satisfatórios com melhor preservação da função renal. A via de acesso aberta é preferível à laparoscópica ou robótica para nefrectomia parcial, pelo menor tempo de isquemia, menores índices de complicações intra e pós-operatórias e limitada evidência de eficácia e segurança de longo prazo para via robótica.
  3. Procedimentos de termoablação pelo frio (crioablação) ou calor (radiofrequência) de lesões renais menores que 4 cm não produzem resultados oncológicos equivalentes à ressecção cirúrgica, podendo ser reservados para lesões incidentais em doentes com comorbidades ou idade avançada, que impliquem em risco cirúrgico proibitivo, doentes com recorrência local após nefrectomia parcial e na presença de lesões multifocais.
  4. Não há indicação clínica de tratamento sistêmico (medicamentoso) com finalidade neoadjuvante (quimioterapia prévia ou citorrredutora) ou adjuvante (quimioterapia pós-operatória ou profilática) após a remoção completa de tumores renais (ressecção cirúrgica sem doença residual).
  5. A radioterapia pós-operatória é um procedimento em desuso na prática oncológica, não sendo recomendada nestas Diretrizes. Estudos com técnicas de irradiação já ultrapassadas mostraram que este tratamento pode reduzir a taxa de recorrência local sem diminuir, no entanto, o risco de recidiva ou morte pela doença.
  6. Após nefrectomia radical ou parcial, os pacientes devem ser acompanhados com



**Poder Judiciário**  
Estado do Espírito Santo  
Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes - NAT

---

anamnese, exame físico, radiografia de tórax e US de abdômen a cada três meses no primeiro ano, a cada seis meses no segundo ano e anualmente nos anos seguintes.

7. No que se refere à doença metastática, nos últimos cinco anos, seis novas drogas de administração oral foram aprovadas para o tratamento de câncer de rim. Elas têm como objetivo diminuir a formação dos vasos sanguíneos que nutrem o tumor. Essas drogas vieram substituir a imunoterapia, que era tratamento padrão anteriormente usado para casos metastáticos, com resultados muito superiores e menos efeitos colaterais.

## **DO PLEITO**

1. **Nefrectomia radical para tratamento oncológico.**

## **III – CONCLUSÃO**

1. De acordo com os documentos anexados, trata-se de um paciente de 78 anos que se encontra internado no Hospital Menino Jesus em virtude de apresentar quadro de anemia, 15 dias sem evacuar e sem conseguir andar, com diagnóstico de câncer renal, sendo solicitado transferência para leito de cirurgia oncológica, pois tem indicação de nefrectomia radical.
2. A Nefrectomia Radical é um procedimento oferecido pelo SUS, sob o código 04.09.01.020-0, sendo considerado de média complexidade, segundo o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS (Tabela SIGTAP). Ressalta-se que para as grandes massas renais, em que se antecipa a indicação de nefrectomia, não se recomenda a realização prévia de biópsias.
3. Consta no Espelho de Solicitação de Transferência Hospitalar que o Requerido apresenta na TC realizada presença de nódulos pulmonares de provável natureza secundária. O que sugere que possa ser presença de metástase. Em se confirmando a



## **Poder Judiciário**

Estado do Espírito Santo

Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes - NAT

---

presença de metástase cabe ao oncologista que acompanha o Requerido definir se antes do procedimento cirúrgico realizará quimioterapia ou não. Desta forma este NAT entende que o Requerido deveria ser transferido para estabelecimento hospitalar com leito de oncologia clínica. Caso o oncologista defina que não está indicado a quimioterapia prévia, aí sim o paciente terá indicação de realizar a nefrectomia radical.



### **REFERÊNCIAS**

Ministério da Saúde – Brasília, 2014 - Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em Oncologia. Disponível em:  
[http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos\\_clinicos\\_diretrizes\\_terapeuticas\\_oncologia.pdf](http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_clinicos_diretrizes_terapeuticas_oncologia.pdf)

EQUIPE ONCOGUIA. Avanços no tratamento do câncer de rim melhoram prognóstico de pacientes com metástase. 15/09/2015. Disponível em:  
<http://www.oncoguia.org.br/conteudo/artigo-avancos-no-tratamento-do-cancer-de-rim-melhoram-prognostico-de-pacientes-com-metastase/1009/8/>